

Vorlesung zu Kapitel 04:<sup>1</sup>

# Funktionen einer Variablen



Moodle



Lehrbuch

---

<sup>1</sup>Aus „Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler“ von Sydsæter, Hammond, Strøm und Carvajal, 6. Auflage

~~4.1 Einführung~~

4.2 Definitionen

4.3 Graphen von Funktionen

4.4 Lineare Funktionen

~~4.5 Lineare Modelle~~

4.6 Quadratische Funktionen

4.7 Polynome

4.8 Potenzfunktionen


4.9 Exponentialfunktionen

4.10 Logarithmusfunktionen

## 4.2 Definitionen

## Definition: Funktion, Definitionsbereich, Wertebereich

Eine (reellwertige) **Funktion** einer reellen Variablen  $x$  mit **Definitionsbereich**  $D$  ist eine Regel  $x \mapsto f(x)$ , die jeder Zahl  $x$  in  $D$  eine eindeutige reelle Zahl  $f(x)$  zuordnet. Die Menge der Werte  $f(x)$ , die man erhält, wenn  $x$  im Definitionsbereich variiert, nennt man den **Wertebereich**  $R$  von  $f$ .



## Definition: (strikt) monoton wachsend

Sei  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  eine Funktion.


Die Funktion  $f$  heißt **monoton wachsend**, wenn für  $x_1, x_2 \in D$  aus  $x_1 < x_2$  folgt  $f(x_1) \leq f(x_2)$ .

Die Funktion  $f$  heißt **strikt monoton wachsend**, wenn für  $x_1, x_2 \in D$  aus  $x_1 < x_2$  folgt  $f(x_1) < f(x_2)$ .

**Monoton fallend** und **strikt monoton fallend** ist entsprechend definiert.

# 4.3 Graphen von Funktionen

# Koordinatensystem




Wir nennen dieses Koordinatensystem auch  $xy$ -Ebene oder  $\mathbb{R}^2$ .


# Graph

Der **Graph** einer Funktion  $f$  ist die Menge aller geordneten Paare  $(x, f(x))$ , wobei  $x$  zum Definitionsbereich von  $f$  gehört.


$x$	0	1	2	3	4
$f(x)$	3	0	-1	0	3




## Wichtige Graphen: $f(x) = x$




## Wichtige Graphen: $f(x) = x^2$




## Wichtige Graphen: $f(x) = x^3$




## Wichtige Graphen: $f(x) = \sqrt{x}$



## Wichtige Graphen: $f(x) = \frac{1}{x}$



## Wichtige Graphen: $f(x) = |x|$



# 4.4 Lineare Funktionen




## 4.4 Lineare Funktionen

$$f(x) = a \cdot x + b$$


$$a, b, x \in \mathbb{R}$$

$a$ : Steigung

$b$ :  $y$ -Achsenabschnitt



# Lineare Funktionen: Berechnung der Steigung



# Lineare Funktionen: Punkt-Steigungsformel einer Geraden

$$f(x) = a \cdot x + b \qquad a, b, x \in \mathbb{R}$$

Die **Steigung** einer Geraden ist

$$a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, \qquad x_1 \neq x_2,$$

wobei  $(x_1, y_1)$  und  $(x_2, y_2)$  zwei beliebige verschiedene Punkte auf der Geraden sind.

Die Gleichung einer Geraden mit der Steigung  $a$  durch den Punkt  $(x_1, y_1)$  ist

$$y - y_1 = a(x - x_1)$$

für  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ .


# Grafische Lösungen von linearen Gleichungen

Jede lineare Gleichung repräsentiert eine Gerade.


Erfüllt ein geordnetes Paar  $(x, y)$  eine lineare Gleichung, so liegt es auf der entsprechenden Geraden.

Erfüllt ein geordnetes Paar  $(x, y)$  mehrere lineare Gleichungen, so liegt es auf all den entsprechenden Geraden.

# Grafische Lösungen von linearen Gleichungen



# Grafische Darstellung linearer Ungleichungen



# 4.6 Quadratische Funktionen




## 4.6 Quadratische Funktionen

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

mit  $a, b, c \in \mathbb{R}$  und  $a \neq 0$

- A Für welche Werte von  $x$  (falls es welche gibt) ist  $ax^2 + bx + c = 0$ ?
  
- B Welches sind die Koordinaten des Maximums-/Minimumpunktes  $P$ ?

# Parabeln: Graphen von $f(x) = ax^2 + bx + c$



## Nullstellen:

$$x_{1/2} = -\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = -\frac{b}{2a}$$

keine

## Scheitelpunkt:

$$\left( -\frac{b}{2a}, -\frac{b^2}{4a} + c \right)$$

# Beispiel: Firma in Wettbewerbsmarkt

**Marktpreis (gegeben):**  $p$

**Kostenfunktion:**  $c(q) = 2q + \frac{1}{2} \cdot q^2$  mit  $q \geq 0$

**Gewinnfunktion:**


$$\pi(q) = p \cdot q - c(q) =$$

$$\Rightarrow q^*(p) =$$

$$\Rightarrow \pi(q^*(p)) =$$

# 4.7 Polynome

## Polynom vom Grad $n = 3$ : Kubische Funktionen



## Definition: Allgemeines Polynom

Die Funktion  $P$ , die für alle  $x \in \mathbb{R}$  definiert ist durch

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 ,$$

wobei  $n \in \mathbb{N}$  und  $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$  sind mit  $a_n \neq 0$ , heißt das **allgemeine Polynom vom Grade  $n$**  mit den **Koeffizienten**  $a_n, a_{n-1}, \dots, a_0$ .

Die Gleichung

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0$$

heißt die **allgemeine Gleichung  $n$ -ter Ordnung**.

# Wurzeln und Extremstellen eines allgemeinen Polynoms

Eine Zahl  $x \in \mathbb{R}$ , für die das allgemeine Polynom  $P$  den Wert null annimmt, also  $P(x) = 0$  gilt, heißt **Wurzel** von  $P$ .

Ein Polynom vom Grad  $n \in \mathbb{N}$  kann höchstens  $n$  verschiedene (reelle) Wurzeln haben.

Der Graph eines Polynoms  $n$ -ten Grades kann höchstens  $n - 1$  **Extrempunkte** haben.

Beispiel:

$$P(x) = x^{100} + 1$$

(Ein Extrempunkt, keine Nullstelle)

# Faktorzerlegung von Polynomen

Das Polynom  $P(x)$  hat den Faktor  $x - a \Leftrightarrow P(a) = 0$  .

Beispiel:

$x - 5$  ist ein Faktor des Polynoms  $P(x) = x^3 - 3x^2 - 50$ .

# 4.8 Potenzfunktionen


# Potenzfunktion

Die allgemeine **Potenzfunktion**  $f$  ist für  $x > 0$  definiert durch die Formel

$$f(x) = Ax^r ,$$

wobei  $A, r \in \mathbb{R}$ .

# Graphen von Potenzfunktionen



# 4.9 Exponentialfunktionen

# Die allgemeine Exponentialfunktion

Die **allgemeine Exponentialfunktion** mit der Basis  $a > 0$  ist

$$f(x) = Aa^x ,$$

wobei  $A, a \in \mathbb{R}$  und  $a$  der Faktor ist, mit dem sich  $f(x)$  ändert, wenn  $x$  um 1 steigt.

Falls  $a = 1 + p/100$ , wobei  $p > 0$  und  $A > 0$ , dann wird  $f(x)$  um  $p\%$  anwachsen für jedes Wachstum von  $x$  um 1 Einheit.


Falls  $a = 1 - p/100$ , wobei  $0 < p < 100$  und  $A > 0$ , dann wird  $f(x)$  abnehmen um  $p\%$ , wenn  $x$  um 1 steigt.

# Die natürliche Exponentialfunktion

Die zur Basis  $e$  gehörige Exponentialfunktion

$$f(x) = e^x \quad (\text{mit } e = 2,71828\dots)$$

wird **die natürliche Exponentialfunktion** genannt.




# 4.10 Logarithmusfunktionen

## Definition: Natürlicher Logarithmus

Für jede positive Zahl  $b \in \mathbb{R}_{>}$  ist

$$e^{\ln(b)} = b .$$

Daher ist  $\ln(b)$  der Exponent, mit dem  $e$  potenziert werden muss, um  $b$  zu erhalten.



# Regeln für die natürliche Logarithmusfunktion $\ln$

Seien  $x$  und  $y$  positiv:

a)  $\ln(xy) = \ln(x) + \ln(y)$

b)  $\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln(x) - \ln(y)$

c)  $\ln(x^p) = p \ln(x)$

d)  $\ln(1) = 0, \ln(e) = 1$

e)  $x = e^{\ln(x)}$

f) und für beliebiges  $x$  gilt  $\ln(e^x) = x$

# Zusammenfassung

- ▶ Definitions- und Wertebereich, Monotonie
- ▶ Graphen von Funktionen
- ▶ Lineare Funktionen:  
Berechnung der Steigung
- ▶ Polynome:  
Quadratische & kubische Funktionen, allgemeines Polynom  
Wurzeln, Extrempunkte, Faktorzerlegung
- ▶ Potenzfunktionen
- ▶ Exponential- und Logarithmusfunktionen